潍坊市环境空气质量现状及变化特征研究

安可珍, 王斌之

(山东省潍坊生态环境监测中心, 山东 潍坊 261041)

摘要: 文章分析了潍坊市城区大气环境空气质量时空分布特征, 监测的污染物为 PM_{10} 、 SO_2 、 NO_2 、 $PM_{2.5}$ 、 O_3 、CO 共6项。2015~2017年 SO_2 和 NO_2 年均浓度基本呈下降趋势, 均低于国家二级标准, SO_2/NO_2 值呈逐年下降趋势; PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 浓度时间变化规律基本相同, 呈现夏季浓度较低、冬季浓度较高; CO 年均浓度呈小幅下降趋势; O_3 - 8 h 年均浓度在 $109 \sim 119 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间, 臭氧的污染不容忽视。从空间分布来看, 8个自动监测点位周边情况不同, 均能反映其区域环境空气质量状况。

关键词: 环境空气质量; 时间变化; 空间变化; 年均值; 日均值

中图分类号: X831

文献标志码: A

DOI: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2019.04.019

Research on Situation and Variation Characteristics of Environmental Air Quality in Weifang City

AN Kezhen, WANG Binzhi

(Weifang Ecological Environment Monitoring Center, Weifang 261041, China)

Abstract: This paper analyzes the spatial and temporal distribution of environmental air quality in urban district of Weifang, and the monitored pollutants include PM_{10} , SO_2 , NO_2 , $PM_{2.5}$, O_3 and CO. The average annual concentrations of SO_2 and NO_2 from 2015 to 2017 basically declines, which are lower than the national second standard, and the value of SO_2/NO_2 decreases year by year. The concentration variations of PM_{10} and $PM_{2.5}$ have basically the same trend, showing lower concentration in summer and higher concentration in winter. The average annual concentration of CO shows a small downward trend, while that of O_3 - 8 h is between $109 \mu\text{g}/\text{m}^3$ and $119 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Ozone pollution can't be ignored. From the perspective of spatial distribution, the eight monitoring points in different positions can reflect the environmental air quality of their regions.

Keywords: Environmental Air Quality; Temporal Distribution Variation; Spatial Distribution Variation; Average Annual Concentration; Average Daily Concentration

CLC number: X831

潍坊市城区选取大气环境空气质量自动监测国控点位8个, 分别是市环保局、潍坊学院、潍城区监测站、朱刘小学、寒亭监测站、峡山水库、坊子邮政和鑫汇集团。主要监测项目有 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 、CO 和 O_3 。潍坊市污染物浓度及比值年际变化的分析数据来自中国环境监测总站网上发布数据; 大气污染物浓度及比值的月际变化、日变化、空间变化的分析数据来自潍坊市城区8个监测点位的自动监测数据^[1]。

1 常规污染物浓度的变化特征

1.1 SO_2 浓度时空变化

1.1.1 时间变化特征

2017年, 潍坊市 SO_2 年均

浓度为 $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。2015~2017年 SO_2 年均浓度基本呈下降趋势, 从44降至 $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 数据来自中国环境监测总站网。

对2015~2017年潍坊市各月环境空气质量监测结果进行统计, SO_2 月均浓度呈现典型的“U”型分布, 1、2和12月浓度较高, 7、8月较低; 各月月均浓度呈逐年下降趋势, 见图1, SO_2 年均浓度下降说明对燃煤管控取得了效果。潍坊市 SO_2 浓度冬季较高与燃煤取暖有关, 夏季较低与二次反应较强消耗 SO_2 有关。

对2017年 SO_2 小时值日变化统计可知, SO_2 小时值日变化呈现“单峰”现象, 日峰值出现在9时 $32 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 谷值出现在15~17时 $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 见图2。

收稿日期: 2019-03-11

作者简介: 安可珍(1963-), 女, 高级工程师。研究方向: 环境监测。

引用格式: 安可珍. 潍坊市环境空气质量现状及变化特征研究[J]. 环境保护科学, 2019, 45(4): 100-105.

图1 2015~2017年SO₂浓度月变化

图3 NO₂浓度月变化

图2 2017年SO₂浓度日变化

与交通早晚高峰及O₃的生成机制有关,白天特别是10:00~17:00时段,NO_x等污染物在较强的太阳辐射下发生光化学反应生成O₃,NO_x被消耗,因此NO₂浓度在这一时段较低。夜间不利于NO₂扩散,使得其在近地层积累。

图4 2015~2017年NO₂浓度小时变化

1.1.2 空间变化特征 2017年潍坊市各监测点位SO₂平均浓度为19~31 μg/m³,潍城区监测站浓度最高31 μg/m³,与周边热电厂和餐饮等有关;朱刘监测站次之29 μg/m³,与工业企业排放有关;潍坊学院19 μg/m³和鑫汇集团20 μg/m³较低,数据来自中国环境监测总站网。

1.2 NO₂浓度时空变化

1.2.1 时间变化特征 2015~2017年NO₂年均浓度分别为36、35、35 μg/m³,年均浓度基本不变,说明对机动车管控效果不明显^[2]。对2015~2017年各月市区环境空气自动站监测结果统计看出,NO₂月均浓度呈现U型分布,1和12月较高,7月最低;各月月均浓度在不同年际间差距较小,见图3。NO₂浓度冬季较高与燃煤取暖有关,夏季较低与二次反应较强消耗NO_x有关。

对2017年监测期间NO₂小时值日变化统计,NO₂日变化存在“单峰单谷”趋势,日峰值出现在7~8时45 μg/m³,谷值出现在14时18 μg/m³,夜间20时到凌晨3时NO₂小时浓度始终维持较高水平40~42 μg/m³,见图4。NO₂浓度日变化规律

1.2.2 空间变化特征 2017年各监测点位NO₂年均浓度在34~40 μg/m³之间。其中朱刘监测站和寒亭监测站较高,均为40 μg/m³,峡山水库最低25 μg/m³。朱刘监测站较高与周边工业企业和机动车的排放有关;寒亭监测站则是由于紧邻主干道,机动车排放NO_x;峡山水库位于风景区,周边工业和机动车排放源较少,故而NO₂最低,数据来自中国环境监测总站网。

1.3 PM₁₀浓度时空变化

1.3.1 时间变化特征 2015~2017年PM₁₀年均浓度分别为135、124、119 μg/m³,均超过《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准限值0.9倍、0.8倍、0.7倍,呈下降趋势,年均浓度下降说明对扬尘管控取得一定效果,PM₁₀浓度依然较高^[3],扬尘污染仍不容忽视。

2015 ~ 2017 年各月 PM₁₀ 监测结果统计可知, 潍坊市 PM₁₀ 月均浓度 7 和 8 月较低, 1 和 12 月较高, 见图 5。潍坊市 PM₁₀ 浓度变化呈现出夏季污染较轻、冬季污染较重的变化特征。冬季风速较低、边界层较低等导致污染物易于累积, 故 PM₁₀ 浓度较高; 春季风速较高, 易出现沙尘天气, 故春季 PM₁₀ 浓度也相对较高^[4]。

图 5 2015 ~ 2017 年 PM₁₀ 浓度月变化

对 2017 年 PM₁₀ 小时值进行日变化统计, PM₁₀ 浓度日变化呈“单峰单谷”分布, 日峰值出现在 9 时, 浓度为 131 μg/m³, 谷值出现在 16 ~ 17 时, 浓度为 93 μg/m³, 见图 6。日间 PM₁₀ 浓度在 8 ~ 13 时较高, 这主要与人们的生产、生活活动有关。夜间不利于污染物扩散, 所以 PM₁₀ 浓度维持在较高水平。

图 6 PM₁₀ 浓度日变化图

1.3.2 空间变化特征 根据 2017 年各监测点位 PM₁₀ 监测结果统计, 潍坊市各监测点位 PM₁₀ 年均浓度在 80 ~ 125 μg/m³ 之间。寒亭监测站点位 PM₁₀ 年均浓度最高, 与周边建筑施工带来的扬尘有关, 峡山水库最低, 位于风景区, 植被较多, 有利于抑制扬尘。

1.4 PM_{2.5} 的时空变化

1.4.1 时间变化特征 从总站发布数据表明:

2015 ~ 2017 年潍坊市 PM_{2.5} 年均浓度分别为 72、64 和 60 μg/m³, 呈逐年下降趋势, 说明对细颗粒物管控取得一定效果。年均浓度分别超标《环境空气质量标准: GB3095—2012》二级标准 1.1 倍、0.8 倍和 0.7 倍, 说明细颗粒物污染不容忽视^[5-7]。

从 2015 ~ 2017 年各月份 PM_{2.5} 浓度变化可知, 1 和 12 月月均浓度较高, 7 和 8 月月均浓度较低, 见图 7, 呈现夏季污染较轻、冬季污染较重的特点, 冬季风速较低、边界层较低等导致污染物易于累积, 所以 PM_{2.5} 浓度较高; 夏季气象条件较好, 污染物易扩散, 故 PM_{2.5} 浓度较低。

图 7 2015 ~ 2017 年 PM_{2.5} 浓度月变化

对 2017 年 PM_{2.5} 小时值进行日变化统计, PM_{2.5} 日变化趋势与 PM₁₀ 类似如图 6, 呈“单峰单谷”分布, 日峰出现在 9 时 72 μg/m³, 谷值出现在 16 ~ 17 时, 浓度均为 46 μg/m³, 超过国家环境空气质量日二级标准 35 μg/m³, 需加强对细颗粒物的控制, 见图 8。

图 8 PM_{2.5} 浓度日变化

1.4.2 空间变化特征 对 2017 年各监测点位 PM_{2.5} 监测结果进行统计, 潍城区监测站 PM_{2.5} 浓

度最高 $67 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 与周边机动车排放有关; 鑫汇集团 $\text{PM}_{2.5}$ 较高 $61 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 可能与工业企业燃煤锅炉湿法脱硫排放的硫酸盐有关; 峡山水库最低 $52 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 峡山水库位于风景区, 周边排放源少。

1.5 臭氧 (O_3 -8 h) 的时空变化

1.5.1 时间变化特征 2015~2017年 O_3 -8 h 年均浓度分别为 119、109、114 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 均超过了 $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 臭氧污染也不容小觑^[8]。根据2015~2017年 O_3 -8 h 月均浓度变化结果, 月均浓度变化呈现“M型”, 峰值出现在6和9月, 1和12月浓度较低, 见图9, 夏季较高与较强光化学反应有关, 7~8月略有下降, 与潍坊市7~8月雨季有关, 冬季较低则因为光强较弱不利于光化学反应发生。

图9 2015~2017年 O_3 -8 h 浓度月际变化

根据2017年 O_3 -8 h 小时值日变化曲线, O_3 -8 h 呈现明显的“单峰单谷”分布, 峰值出现在15时 $122 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 最低值出现在6时 $36 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 见图10。大气中 NO_x 和 TVOCs 在太阳辐射条件下生成 O_3 , 是 O_3 的前体物, 另外 CO 也可以作为 O_3 的前体物。 O_3 的日变化特征主要与其前体物有密切关系, 白天12~16时段 O_3 浓度较高, 这

图10 O_3 -8 h 浓度日变化

是由 NO_x 和 CO 或 VOCs 等在较强的太阳辐射下发生光化学反应生成 O_3 所致。夜间浓度较低, 一方面是因为 O_3 的生成速率降低, 另一方面 O_3 被高浓度的 NO_x 反应所消耗。

1.5.2 空间变化特征 2017年各监测点位 O_3 -8 h 年均浓度全在 $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上, 峡山水库最高 $81 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 其余点位 O_3 -8 h 年均浓度相差不大, 在 $69 \sim 76 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间。峡山水库位于风景区, 植被覆盖率高, 植被排放 O_3 的前体物 VOCs 可能会促进臭氧的生成。

1.6 CO 的时空变化

1.6.1 时间变化特征 2015、2016、2017年 CO 年均浓度分别为 1.00、0.95 和 0.90 mg/m^3 , 呈小幅下降趋势, 说明对 CO 的管控作用有效^[9]。

2015~2017年潍坊市 CO 月均浓度呈“U型”分布, 其中12和1月较高, 6和7月较低, 具体见图11。潍坊市 CO 浓度冬季较高, 与燃煤散烧有关; 夏季 CO 浓度较低, 一是因为排放源较少, 二是气象条件有利于污染物的扩散。

图11 2015~2017年 CO 浓度月际变化

2017年潍坊市 CO 日浓度变化情况, 见图12, CO 呈明显的“单峰单谷”变化趋势。日峰值出现在8时 ($1.20 \text{mg}/\text{m}^3$), 谷值出现在16时 ($0.72 \text{mg}/\text{m}^3$)。CO 变化规律与早晚交通高峰变化是一致的, 这与机动车等污染源的排放、气象条件以及 CO 消除机制有关。

1.6.2 空间变化特征 从潍坊市各监测点位 CO 年均浓度变化结果可知, 2017年潍坊市各监测点位 CO 年均浓度在 $0.80 \text{mg}/\text{m}^3$ 之上, 朱刘监测站最高 $1.12 \text{mg}/\text{m}^3$, 可能与其周边焦化厂的排放有关; 坊子邮政最低 $0.80 \text{mg}/\text{m}^3$, 数据来自中国环

境监测总站网。

图 12 2017 年 CO 浓度日变化

2 特征比值变化分析

2.1 SO₂/NO₂

2015 ~ 2017 年潍坊市 SO₂/NO₂ 年均比值依次为 1.18、1.04 和 0.70, 年均比值逐渐降低, 2017 年下降幅度较大, 说明相对于固定源, 移动源排放比重逐渐上升。

对潍坊市 2015 ~ 2017 年月均 SO₂/NO₂ 比值统计, 发现 1、2 和 12 月 SO₂/NO₂ 比值较高, 3 ~ 11 月比值较为稳定, 变化幅度较小, 见图 13。潍坊市冬季 SO₂/NO₂ 比值较高可能与冬季燃煤取暖有关, 其他月份因为移动源和固定源的排放量变化不大, 所以 SO₂/NO₂ 比值较为稳定。

图 13 2015 ~ 2017 年 SO₂/NO₂ 比值月际变化

通过对 2017 年潍坊市各监测点位 SO₂/NO₂ 比值进行统计, 发现峡山水库 SO₂/NO₂ 比值最高 (1.46), 该点位在风景区, 移动源较少; 寒亭监测站和鑫汇集团 SO₂/NO₂ 比值较低, 分别为 0.58 和 0.73, 寒亭监测站 SO₂/NO₂ 比值较低因为紧邻主干道, 移动源贡献较大; 鑫汇集团 SO₂/NO₂ 比值

较低, 与工业企业安装了湿法脱硫设施、尚未安装脱硝设施有关, 排放的 NO_x 多于 SO₂; 另外周边有主干道的潍坊学院 SO₂/NO₂ 比值也较低 (0.75), 见图 14。

图 14 2017 年各监测点位 SO₂/NO₂ 比值

2.2 PM_{2.5}/PM₁₀

2015 ~ 2017 年潍坊市 PM_{2.5}/PM₁₀ 比值分别为 0.52、0.50、0.48, 年均比值逐年下降, PM_{2.5} 在 PM₁₀ 中的平均占比为 0.5, 说明潍坊市细颗粒物污染和粗颗粒物污染都不容忽视。

按月份对潍坊市 2015 ~ 2017 年 PM_{2.5}/PM₁₀ 月均比值分析, 1、2 和 12 月 PM_{2.5}/PM₁₀ 月均比值较高, 5、6 月比值较低, 见图 15。冬季 PM_{2.5}/PM₁₀ 比值较高, 是雾霾天气高发季节; 春季由于易出现沙尘天气, PM₁₀ 浓度远高于 PM_{2.5}, 所以 PM_{2.5}/PM₁₀ 比值较低。

图 15 2015 ~ 2017 年 PM_{2.5}/PM₁₀ 比值月变化

通过对比潍坊市 2017 年各监测点位 PM_{2.5}/PM₁₀ 比值可知, 峡山水库 PM_{2.5}/PM₁₀ 比值最高 (0.63), 因为该点位周边植被较多, 可以防风固沙, 有利于降低 PM₁₀ 浓度; 坊子邮政和寒亭监测站 PM_{2.5}/PM₁₀ 比值较低, 均为 0.44, 见图 16。坊子邮

政和寒亭监测站周边存在许多建筑施工工地,建筑施工带来扬尘导致 PM_{10} 升高。

图 16 2017 年各监测点位 $PM_{2.5}/PM_{10}$ 比值

3 空气质量现状评价

对潍坊市 2017 年各月份优良天数统计,全年优良天气共 210 d,轻度污染和中度污染天气共 140 d,严重污染和重度污染天气共 15 d,优良天气占比为 57.5%。潍坊市夏季(6~8 月)优良率最高为 66.1%;秋季(9~11 月)、春季(3~5 月)次之,分别为 61.4% 和 61.0%;冬季(12~2 月)最低为 48.0%,这主要与潍坊市冬季采暖、气象条件及排放源区域运输影响有关。

4 结论

(1)2017 年,潍坊市 SO_2 平均浓度为 $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, NO_2 平均浓度为 $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$, SO_2/NO_2 比值为 0.63。2015~2017 年潍坊市环境空气 SO_2 和 NO_2 年均浓度呈下降趋势,均低于国家二级标准, SO_2/NO_2 值呈逐年下降趋势,说明移动源排放的影响比重逐渐上升。

(2)2017 年潍坊市 $PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 年均浓度分别为 60 和 $119 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $PM_{2.5}/PM_{10}$ 比值为 0.48。二者浓度时间变化规律基本相同,呈现夏季浓度较低、冬季浓度较高季节变化特征。 $PM_{2.5}/PM_{10}$ 比值季节变化明显,春季、夏季较低,冬季较高。冬季由于采暖,导致燃煤排放的细颗粒物增多, $PM_{2.5}$ 的占比升高,是雾霾天气的高发季节。春季 $PM_{2.5}/PM_{10}$ 比值最小,这是春季沙尘天气频发所致。2015~2017 年 $PM_{2.5}/PM_{10}$ 比值逐年下降。

(3)2017 年,潍坊市 O_3 -8 h 年均浓度为 $114 \mu\text{g}/\text{m}^3$,CO 年均浓度为 $0.90 \text{ mg}/\text{m}^3$ 。2015~2017 年潍坊市 CO 年均浓度呈小幅下降趋势,说明对 CO 的管控作用有效; O_3 -8 h 年均浓度在 $109 \sim 119 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 之间,臭氧的污染不容忽视。

(4)从空间变化来看,2017 年潍坊市各点位潍城区监测站 $31 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 和昌乐朱刘小学 $29 \mu\text{g}/\text{m}^3$ SO_2 浓度较高,潍坊学院 ($19 \mu\text{g}/\text{m}^3$) 和鑫汇集团 $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 较低; NO_2 年均浓度昌乐朱刘小学和寒亭监测站较高均为 $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$,峡山水库最低 $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$;各点位 PM_{10} 平均浓度寒亭监测站最高 $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$,峡山水库最低 $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$;各监测点位 $PM_{2.5}$ 浓度潍城区监测站最高 $67 \mu\text{g}/\text{m}^3$,峡山水库最低 $52 \mu\text{g}/\text{m}^3$;各点位 O_3 -8 h 年均浓度全在 $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上,峡山水库最高 $81 \mu\text{g}/\text{m}^3$,其余点位浓度相差不大;各点位 CO 年均浓度昌乐朱刘小学最高 $1.12 \text{ mg}/\text{m}^3$,坊子邮政最低 $0.80 \text{ mg}/\text{m}^3$ 。

(5)峡山水库 SO_2/NO_2 比值最高,该点位在风景区,移动源较少;寒亭监测站 SO_2/NO_2 比值较低因为紧邻主干道,移动源贡献较大;鑫汇集团 SO_2/NO_2 比值较低,与工业企业安装了湿法脱硫设施、尚未安装脱硝设施有关;峡山水库 $PM_{2.5}/PM_{10}$ 比值最高,因为该点位周边植被较多,有利于降低 PM_{10} 浓度;坊子邮政和寒亭监测站 $PM_{2.5}/PM_{10}$ 比值较低,坊子邮政和寒亭监测站周边存在许多建筑施工工地扬尘导致 PM_{10} 升高。

参考文献

- [1] 国家环境保护部科技标准司. 环境空气质量标准:GB 3095-2012 [S]. 北京:中国环境科学出版社,2012.
- [2] 郑晓霞,李令军,赵文吉,等. 北京京津冀地区大气 NO_2 污染特征研究[J]. 生态环境,2014(12):1938-1945.
- [3] 杨文涛,姚诗琪,邓敏,等. 北京市 $PM_{2.5}$ 时空分布特征及其与 PM_{10} 关系的时空变异特征[J]. 环境科学,2018,39(2):684-690.
- [4] 董娅玮,杜新黎,李扬扬,等. 西安市区大气中 $PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 质量浓度污染特征[J]. 中国环境监测,2015,31(5):45-49.
- [5] 潘本锋,郑皓皓,李莉娜,等. 空气自动监测中 $PM_{2.5}$ 与 PM_{10} “倒挂”现象特征及原因[J]. 中国环境监测,2014,30(5):90-95.
- [6] 邱玉瑾,邱玉珺. 我国西北典型大城市大气可吸入颗粒物浓度分布特征[J]. 中国环境监测,2010,26(3):65-68.
- [7] 包贞,冯银厂,焦荔,等. 杭州市大气 $PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 污染特征及来源解析[J]. 中国环境监测,2010,26(2):44-48.
- [8] 吴嘉荣,黄小燕. 泉州市区臭氧浓度变化特征分析及控制措施[J]. 海峡科学,2006(7):40-41.
- [9] 汪浩,陈操操,潘涛,等. 京津冀区域生产和消费 CO_2 排放的时空特点分析[J]. 环境科学,2014,35(9):3619-3631.