丙酯草醚降解菌 CY 的分离、鉴定及其降解特性*

蔡志强^{1,2**} 杨百科¹ 赵希岳¹ 陈巧丽¹ 王利群¹ 黄磊¹ 叶庆富²

(1. 常州大学微生物与生物工程实验室, 常州, 213164;

2. 浙江大学, 原子核农业科学研究所, 农业部核农学重点开放实验室, 杭州, 310029)

摘要 采用富集培养的方法,从施用过丙酯草醚除草剂的油菜田中分离筛选出5株以丙酯草醚(ZJ0273)为唯一生长碳源和能源的菌株,选其中降解率高的菌株CY进行研究.根据其生理生化和16S rRNA基因序列相似性分析,鉴定其为芽孢杆菌属(*Bacillus* sp.).根据对CY的初步研究和简单优化,菌株CY在30 d内对50 mg·L⁻¹ ZJ0273的降解率达到55.1%,该菌株降解ZJ0273的最适初始pH值为8.0,最适温度为35℃.菌株CY对ZJ0273的降解效果与初始接种量在一定范围内呈正相关,当初始浓度>400 mg·L⁻¹时,ZJ0273降解率偏低.

关键词 丙酯草醚,芽孢杆菌属,16S rRNA,生物降解,降解特性.

丙酯草醚(ZJ0273),化学名称4-(2-(4,6-二甲氧基-2-嘧啶氧基)苄胺基)苯甲酸正丙酯,是我国研发的具有自主知识产权的农药新品种,属于嘧啶水杨酸类除草剂,该除草剂已获得多项国内外发明专利^[1-2],其作用机理是乙酸乳酸合成酶(acetolactate synthase)抑制剂^[3-5],属缓效性除草剂,主要用于防除油菜阔叶杂草和禾本科杂草,具有较好的应用前景^[6-8].主要复配品种有10%丙酯草醚乳油(EC,商品名:油力)和10%丙酯草醚悬浮剂(SC,油力2号).

关于ZJ0273在环境中的归宿也日益引起人们的重视,ZJ0273易与土壤形成结合残留,在微生物的作用下,在土壤中矿化为CO₂.ZJ0273在不同土壤中的半衰期也不一样,这与土壤理化性质和当地环境有直接关系^[9-10].王伟等^[11]研究发现ZJ0273在土壤中的迁移和淋溶较慢,属不易移动农药.余志扬等^[12]研究表明ZJ0273进入土壤后容易被土壤吸附,不易再发生解吸.Han等^[13]研究表明ZJ0273在土壤中可通过生理与化学作用或者生物化学过程分解,施用过ZJ0273的田地不易续种大米等作物.随着ZJ0273浓度的提高,影响油菜的生长及产量^[14].目前,农药的不合理使用给生态环境和人类健康造成很大的危害,利用微生物对农药的生物降解是最理想的途径,且不会产生二次污染,人们已从自然界中分离出许多降解农药的微生物,主要包括细菌、真菌、放线菌和藻类等^[15-17].

本论文从土壤中分离筛选出一株具有降解ZJ0273的菌株CY,对其降解特性作了初步研究,结果可为ZJ0273残留环境的生物修复提供理论依据和菌株资源.

1 材料与方法

1.1 材料

供试土壤取自江苏省常州市某地长期使用丙酯草醚的油菜田(表层5—15 cm),4℃保存至实验所用.原药丙酯草醚由中国科学院上海有机化学研究所提供,化学纯度为98.6%.

基础培养基(MM, g·L⁻¹):K₂HPO₄ 5.17, KH₂PO₄ 1.70, (NH₄)₂SO₄ 2.63, 盐溶液 10 mL, pH 7.0—7.2(固体MM需加15—20 g的琼脂).ZJ0273在MM灭菌后,冷却至50℃左右加入.

盐溶液(g·L⁻¹):MgSO₄ 19.5, MnSO₄ 5, FeSO₄ 5, CaCl₂ 0.3.

2010年10月15日收稿.

* 国家自然科学基金(面上项目10775118,重点项目20632070);中国科学院知识创新工程重要方向项目(KGCX3-SYW-203-03);农业部公益性行业科研专项(200803034);常州市科技基金项目(20092008)资助.

** 通讯联系人, Tel: 0519-86330256; E-mail: zhqcai@cczu.edu.cn

LB 培养基($\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$):蛋白胨 10,酵母膏 5,NaCl 5,pH 7.0—7.2(固体 LB 需加 15—20 g 的琼脂).

丙酯草醚原药浓度 $20000 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$. 本实验所用药品为分析纯试剂.

1.2 菌株的分离和筛选

取土样 5 g 加入到含 ZJ0273($200 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$)的 100 mL MM 中,于 $30\text{ }^\circ\text{C}$, $130 \text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 摇床中富集培养,每隔 6 d 取培养液接种到相同的富集培养基中,转接量为 10% (V/V),连续转接 6 次,然后取 100 μL 富集培养液梯度稀释,取合适的浓度涂布于含 ZJ0273($200 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$)的 MM 平板中, $30\text{ }^\circ\text{C}$ 培养 6 d. 挑取具有不同形态特征的单菌落接种于 MM 平板(同上),连续划线纯化培养 10 次,得到 5 株纯化菌株;然后把纯化菌株接种于 LB 培养基增殖培养 15 h($\text{OD}_{600} = 1.900$),取菌液 2 mL 离心,菌体加入到 20 mL 含 ZJ0273($200 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$) MM 中,于 $30\text{ }^\circ\text{C}$, $130 \text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 的摇床中振荡培养 15 d,萃取并 HPLC 测定其降解效果,选取降解效果高的菌株 CY 进行研究.

1.3 菌株 CY 的鉴定

菌株形态及生理生化特性分析参照文献[18]进行. 菌株 16S rDNA 基因的扩增及序列测定委托宝生物工程(大连)有限公司完成. 实验方法如下:(1)变性:菌体置于 50 μL Lysis Buffer 中变性,反应条件: $80\text{ }^\circ\text{C}$,15 min,然后离心取上清液作为模板.(2)50 μL PCR 反应体系:上述变性反应液 1 μL ,PCR Premix 为 25 μL ,Forward primer ($2 \times 10^{-8} \text{ mol}\cdot\mu\text{L}^{-1}$)为 0.5 μL ,Reverse primer2 ($2 \times 10^{-8} \text{ mol}\cdot\mu\text{L}^{-1}$)为 0.5 μL ,16S-free H_2O 为 23 μL . (3)PCR 扩增条件: $94\text{ }^\circ\text{C}$,5 min; $94\text{ }^\circ\text{C}$,1 min; $55\text{ }^\circ\text{C}$,1 min; $72\text{ }^\circ\text{C}$,1.5 min;循环 30 次, $72\text{ }^\circ\text{C}$ 延伸 5 min.

1.4 菌株的培养与菌悬液的配制

从冰箱中取出保存的菌株接种于 100 mL LB 液体培养基,置于 $30\text{ }^\circ\text{C}$, $130 \text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 的摇床中振荡培养 15 h,再按 3% 接种量重新接种至 100 mL 新鲜无菌 LB,培养 15—18 h, ($\text{OD}_{600} = 1.900$). 取适量上述菌液,离心($4000 \text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$,10 min)并用无菌生理盐水洗涤菌体,离心去上清液后的菌体作为需添加的菌株.

1.5 残余 ZJ0273 的提取和测定

ZJ0273 的提取:将摇床中三角瓶中的培养液(20 mL)转入 100 mL 分液漏斗中,分别添加二氯甲烷 60 mL(体积比为 1:3)萃取两次,摇荡 2 min,静置分层出有机相后,收集和合并二氯甲烷相于圆底烧瓶中,置旋转蒸发仪中蒸发至干(水浴温度约为 $50\text{ }^\circ\text{C}$),准确移取无水甲醇 20 mL 溶解,高效液相色谱测定.

ZJ0273 含量的测定:采用 HPLC 法,以外标法定量. HPLC 测定色谱的条件:色谱柱:Arcus EP-C18,4.6 mm $\times$ 150 mm,5 μm ;柱温:室温;检测器:UV(Waters 248);流动相(V:V) = 甲醇(色谱级):水(双蒸水) = (90:10,V:V);检测波长:254 nm;流速: $0.8 \text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$;进样量:20 μL .

$$X(\%) = C_{\text{K}}/C_{\text{CK}} \times 100\%$$

式中, X : 残留率, C_{CK} :空白对照样品残留浓度($\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$), C_{K} :处理样品残留浓度($\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$).

1.6 ZJ0273 回收率的测定

为了评估 ZJ0273 在 MM 中的回收率,移取适量 $20000 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 ZJ0273 原药溶液添加至 MM 中,得到一系列含不同浓度($50 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $100 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $200 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $400 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$)ZJ0273 的 MM,按照 1.5 中提取方法,萃取 ZJ0273(3 个重复),HPLC 测定 ZJ0273 在 MM 中的回收率.

2 结果与讨论

2.1 ZJ0273 降解菌的筛选分离与生理生化特性

在含 ZJ0273 的 MM 平板上,挑取 5 株不同形态特征的菌株,做降解预试验,测定培养 15 d 后菌株对 ZJ0273 的降解率(表 1),选取降解率高的菌株 CY 作为实验菌株,对其生理生化特性和降解特性进行初步研究.

表 1 5 菌株对 ZJ0273 的初步降解率及其形态特征

Table 1 The morphology and initial degradation rate of ZJ0273 by five strains

	BQ80	PT12	W13	W73	CY
降解率/%	7.08	11.95	14.16	15.93	24.11
镜检	球形	杆状	杆状	球形	短棒状

菌株 CY(图 1):细胞呈短棒状((2—4 μm) $\times$ (1—1.3 μm)),革兰氏染色阳性,产芽孢,端生鞭毛,氧化酶、过氧化氢酶呈阳性,硝酸盐还原、吡啶反应呈阴性,V. P. 和 M. R. 试验阴性,液化明胶,水解淀粉,产 H_2S ,葡萄糖发酵产酸、氧化不产酸不产气.

图 1 CY 的电镜照片($\times 10000$)Fig. 1 Electron microscopic photo of strain CY($\times 10000$)

2.2 降解菌株 CY 的进化分析

以菌株 CY 总 DNA 为模板,用细菌 16S rRNA 通用引物进行 PCR 扩增,得到长度约为 1427 bp 的扩增产物,根据宝生物工程(大连)生物有限公司的测序结果,测序后在 GenBank 登录,利用 BLAST 软件分析,和 Clustalx1. 81 进行对比,与其它菌株的 16S rRNA 基因的同源性进行比较表明,菌株 CY 与 *B. flexus* (登录号:FJ861081. 1) 等的同源性在 99% 以上. 结合生理生化特性将 CY 鉴定为芽孢杆菌属(*Bacillus* sp.), 应用 MEGA4. 1 软件采用邻接法构建系统发育树(图 2),用 Bootstrap 进化分析(重复 1000 次).

图 2 菌株 CY 的系统发育树

Fig. 2 Phylogenetic tree of strain CY

2.3 ZJ0273 回收率分析

ZJ0273 在 MM 中的回收率及变异系数如表 2 所示,其回收率均在 92.1%—100.3% 之间,变异系数在 0.3%—6.7% 之间.

2.4 培养基初始 pH 对菌株 CY 降解 ZJ0273 的影响

在 ZJ0273 浓度为 $200 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 初始 pH 值分别为 5.0、6.0、7.0、8.0、9.0 的 MM(20 mL) 中,将接种

量为 10% 的菌液 ($OD_{600} = 1.900$) 离心. 离心后菌体接入到上述 MM 中, 置于 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, $130\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 摇床中培养 30 d, 每隔 5 d 取出样品 (同时重复 2 个), 测定 ZJ0273 的残留量, 如图 3 所示, 在 MM 中, 当 pH 值为 8.0 时, CY 对 ZJ0273 降解效果最好, pH 值为 6—7 时, 降解效果较好, 当 $\text{pH} \leq 5$ 或 $\text{pH} \geq 9$ 时, 菌株 CY 对 ZJ0273 的降解力明显降低.

表 2 ZJ0273 的回收率

Table 2 The recovery of ZJ0273 in culture medium

添加浓度 /($\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$)	回收率/%			平均值/%	变异系数 (CV)/%
	I	II	III		
50	90.7	103.5	95.0	96.4	6.7
100	105.5	98.5	94.2	99.4	0.3
200	105.0	98.6	97.3	100.3	4.1
400	96.5	85.8	94.1	92.1	6.1

2.5 温度对菌株 CY 降解 ZJ0273 的影响

在 ZJ0273 浓度为 $200\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 MM (20 mL) 中, 将接种量为 10% 的菌液 ($OD_{600} = 1.900$) 离心, 离心后的菌体接入到上述 MM 中, 分别置于 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $130\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 的摇床中培养 30 d, 每隔 5 d 取出样品 (同上), 测定 ZJ0273 的残留量. 结果如图 4 所示, 菌株降解适宜温度为 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ — $35\text{ }^{\circ}\text{C}$, 当温度在 $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 其降解效果最好, 降解率达到 53.4%; 当温度 $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和温度 $\geq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 菌株对 ZJ0273 降解效果较差, 原因可能是 CY 在此温度区间降解酶受到抑制而失活.

图 3 培养基初始 pH 值对 CY 降解 ZJ0273 的影响

Fig. 3 Effect of initial pH of culture medium on ZJ0273 degradation by strain CY

图 4 温度对菌株 CY 降解 ZJ0273 的影响

Fig. 4 Effect of temperature on ZJ0273 degradation by strain CY

2.6 接种量对菌株 CY 降解 ZJ0273 的影响

在 ZJ0273 浓度为 $200\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 的基础培养基中, 分别以 3%、7%、10%、15%、20% 的接种量处理, 置于 $35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $130\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 的摇床中培养 30 d, 测定 ZJ0273 的残留量. 由图 5 可知, 接种量为 3%—10% 时, ZJ0273 的降解率随着接种量的增加而增大; 当接种量 $\geq 10\%$ 时, ZJ0273 的降解率逐渐趋于稳定.

2.7 农药起始浓度对菌株 CY 降解 ZJ0273 的影响

将接种量为 10% 的菌液 ($OD_{600} = 1.900$) 离心, 离心后的菌体接入到含不同浓度 ($50\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $200\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $400\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$) ZJ0273 的 MM (20 mL) 中, 置于 $35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $130\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 的摇床中振荡培养 30 d, 同时做空白对照 ($50\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$), 每隔 5 d 取出样品 (同上), 测定 ZJ0273 的残留量, 结果如图 6 所示, 随着浓度的升高, CY 对 ZJ0273 的降解能力逐渐降低. 当浓度 $50\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 和 $200\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$, 降解率分别达到 55.1% 和 53.4%; 当浓度 $\geq 400\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 菌株 CY 对 ZJ0273 的降解受到抑制.

图5 接种量对菌株 CY 降解 ZJ0273 的影响

Fig. 5 Effect of inoculating rate on ZJ0273 degradation by strain CY

图6 ZJ0273 起始浓度对 CY 降解 ZJ0273 的影响

Fig. 6 Effect of initial ZJ0273 concentration on ZJ0273 degradation by strain CY

3 结论

(1) 从油菜田土壤中分离出 5 株以 ZJ0273 为唯一碳源和能源生长的菌株,筛选出一株降解率高的菌株,命名为 CY,经形态观察、生理生化特征及 16S rRNA 序列鉴定出其属于芽孢杆菌属(*Bacillus* sp.)。

(2) 根据初步研究,CY 降解 ZJ0273 的最适 pH 值为 8.0,最适温度 35 ℃,降解效果与初始接种量在一定范围呈正相关;随着 ZJ0273 浓度的升高,CY 对 ZJ0273 的降解能力逐渐降低;最佳条件下,30 d 内菌株 CY 对 ZJ0273 的降解率为 55.1%。

参 考 文 献

- [1] 吕龙,陈杰,吴军,等. 2-嘧啶氧基-N-芳基苄胺衍生物、制备方法及应用[P]. WO 02/34724 A1, 2002
- [2] Lu L, Chen J, Wu J, et al. New 2-pyrimidinoyloxy-n-aryl-benzylamine derivatives, their processes and uses[P]. EP1327629, 2007
- [3] 陈杰,袁军,刘继东,等. 新型除草剂丙酯草醚的作用机理[J]. 植物保护学报,2005,32(1):48-52
- [4] Zhao dandan, Liu yong li, Lan dawei, et al. Effects of novel herbicide ZJ0273 on acetolactate synthase activity in oilseed rape and circkweed[J]. Journal of Zhejiang University(Agric. &Life Sci),2009,35(6):633-638
- [5] Zhang F, Jin Z L, Naeem M S, et al. Spatial and temporal changes in acetolactate synthase activity as affected by new herbicide ZJ0273 in rapeseed, barley and water chickweed[J]. Pesticide Biochemistry and physiology,2009,95(6):63-71
- [6] 陈仕高,谢雪梅,蒲正国,等. 10% 丙酯草醚 EC 防除油菜杂草效果及药害分析[J]. 农药,2007,46(3):199-201
- [7] 唐庆红,陈杰,沈国辉,等. 油菜田新型除草剂丙酯草醚的应用技术[J]. 植物保护学报,2006,33(3):328-332
- [8] 付群梅,董德臻,吕龙,等. 丙酯草醚在土壤中的残留及结后茬作物的安全性[J]. 农药,2009,1(1):50-52
- [9] Wang Haiyan, Ye Qinfu, Yue Ling, et al. Kinetics of extractable residue, bound residue and mineralization of a novel herbicide, ZJ0273, in aerobic soils[J]. Chemosphere, 2009,76(8):1036-1040
- [10] Wang Haiyan, Yu Zhiyuan, Yue Ling, et al. Transformation of ¹⁴C-pyrimidinoyloxybenzoic herbicide ZJ0273 in aerobic soils[J]. Science of the Total Environment, 2010,408(10):2239-2244
- [11] 王伟,岳玲,丁炜,等. [A 环-U-¹⁴C]丙酯草醚在土壤中的迁移和淋溶[J]. 核农学报,2007,21(3):283-286
- [12] 余志扬,岳玲,汪海燕,等. [A 环-U-¹⁴C]丙酯草醚在土壤中的吸附与解吸特性研究[J]. 核农学报,2008,22(3):324-328
- [13] Han Ailiang, Yue Ling, Li Zheng, et al. Plant availability and phytotoxicity of soil bound residues of herbicide ZJ0273, a novel acetolactate synthase potential inhibitor[J]. Chemosphere, 2009,77(7):955-961
- [14] Jin Z L, Zhang F, Ahmed Z I, et al. Differential morphological and physiological responses of two oilseed *Brassica* species to a new herbicide ZJ0273 used in rapeseed fields[J]. Pesticide Biochemistry and Physiolog,2010,98(1):1-8
- [15] 曾斌,宁大亮,王慧. 白腐真菌降解五氯酚的初步研究[J]. 环境化学,2008,27(2):181-185
- [16] 尤民生,刘新. 农药污染的生物降解与生物修复[J]. 生态学杂志,2004,23(1):73-77

[17] 彭丽花,任源,邓留杰,等. 间甲酚降解菌 *Citrobacter farmeri* 的降解特性及代谢途径解析[J]. 环境化学,2009,28(1):44-48

[18] 东秀珠,蔡妙英. 常见细菌系统鉴定手册[M]. 北京:科学出版社,2001: 353-398

ISOLATION, IDENTIFICATION AND DEGRADATION CHARACTERISTICS OF A HERBICIDE ZJ0273-DEGRADING STRAIN CY

CAI Zhiqiang^{1,2}   YANG Baike¹   ZHAO Xiyue¹   CHEN Qiaoli¹   WANG liqun¹
HUANG Lei¹   YE Qingfu²

(1. Laboratory of Microbiology and Biotechnology, Changzhou University, Changzhou, 213164, China;

2. Institute of Nuclear Agricultural Science/ Key Lab. of Nuclear-Agricultural Science, Ministry of Agriculture, Zhejiang University, Hangzhou, 310029, China)

ABSTRACT

Propyl (4-(2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy)benzylamino)benzoate (ZJ0273) is a new herbicide used in the rapeseed fields. Five strains which utilize ZJ0273 as sole carbon and energy source were isolated from ZJ0273-used soil in oilseed fields by selective enrichment culture, and a CY strain most capable of degrading ZJ0273 was selected. Based on its physiological and biochemical characteristics and phylogenetic analysis of 16S rRNA sequences, the strain was identified as *Bacillus* sp. . When the initial concentration of ZJ0273 was $50 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ in the basic medium, the degradation rate of ZJ0273 within 30 days was 55.1% by strain CY. The optimal initial pH of culture medium and temperature were 8.0 and 35 °C respectively. The degradation rate of ZJ0273 by strain CY showed a positive correlation with inoculating rate within a certain range, and the degradation rate was lower when initial concentration of ZJ0273 was more than $400 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$.

Keywords: ZJ0273, *Bacillus* sp. , 16S rRNA, biodegradation, degradation characteristics.